

TAPTIQOM[®]

(15µg/ml tafluprost + 5mg/ml maleato de timolol)



OLD NEW
IS THE **NEW**
YOUNG

EFICACIA
DE VIDA REAL

PARA PACIENTES
QUE TODAVÍA SE
SIENTEN JÓVENES

CAMBIE DESDE CUALQUIER PROSTAGLANDINA EN MONOTERAPIA A TAPTIQOM[®] PARA UNA MAYOR EFICACIA Y TOLERABILIDAD¹

- POTENTE DESCENSO DE LA PIO**

tras cambiar desde monoterapia con latanoprost¹

- BUENA TOLERABILIDAD**

sin comprometer la eficacia vs bimatoprost/timolol²

Taptiqom[®] está indicado para la reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que presenten una respuesta insuficiente a la monoterapia tópica con betabloqueantes o análogos de la prostaglandina, que precisen una terapia combinada y que se beneficiarían de un colirio sin conservantes.

1. Oddone F *et al.* Adv Ther 2020; 37(4): 1436-51. 6-month, observational study assessing the efficacy, tolerability and safety of TAPTIQOM[®] after switch in a real-life setting, n=577.
 2. Borne RR *et al.* BMJ Open 2019; 9: e024129. 12 week, open-label phase IV clinical study. Patients used non-preserved or BAK-preserved bimatoprost/timolol for 4 weeks before the study when they were switched to TAPTIQOM[®]. Baseline IOP was 15.9 mmHg and 12 week IOP was 16.3 mmHg (p=0.134).