

La combinación de suplementación oral con triglicérido de DHA y citicolina mejoró significativamente los índices de los campos visuales y de sus pendientes en pacientes afectos de glaucoma tras 3 meses de suplementación, según evidencian los resultados obtenidos de un estudio piloto, controlado, aleatorizado, prospectivo, y de intervención

The Effect of Oral Citicoline and Docosahexaenoic Acid on the Visual Field of Patients with Glaucoma: A Randomized Trial

Alfonso Anton, Virginia Garcia, Marcos Muñoz, Karla Gonzales, Eleonora Ayala, Estela del Mar Sanchez and Antonio Morilla-Grasa

MATERIAL Y MÉTODOS

N=73 participantes aleatorizados en 4 grupos de suplementación con seguimiento de 3 meses:

- Grupo vitamina C (n=17)
- Grupo Tg-DHA (n=16)
- Grupo Citicolina (n=20)
- Grupo Tg-DHA+Citicolina (n=20)

RESULTADOS

El defecto medio del campo visual mejoró significativamente ($p=0,001$) desde $-9,52 \pm 4,36$ hasta $-7,85 \pm 4,36$ dB durante el período de estudio en el grupo que toma DHA+Citicolina. Del mismo modo, los índices medios del campo visual mejoraron significativamente ($p=0,001$) en este grupo. Después de 3 meses, el único grupo de tratamiento que mostró una mejora estadísticamente significativa ($p=0,006$) en el defecto medio (desde $-0,1041 \pm 0,2471$ hasta $-0,1383 \pm 0,2544$ dB/mes), y de la pendiente de los índices medios del campo visual fue el grupo tratado con DHA+Citicolina.

| Visual field parameters at baseline and after 3 months of treatment | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Baseline MD (dB) | Month 3 MD (dB) | p Value | Baseline VFI (%) | Month 3 VFI (%) | p Value |
| Global (mean \pm SD) | -8.96 ± 3.91 | -8.42 ± 4.29 | 0.025 | 77.47 ± 12.83 | 78.52 ± 13.94 | 0.096 |
| Vitamin C (mean \pm SD) | -8.46 ± 3.70 | -8.32 ± 3.87 | 0.727 | 78.35 ± 12.97 | 78.53 ± 13.24 | 0.871 |
| DHA (mean \pm SD) | -9.08 ± 4.07 | -8.86 ± 5.07 | 0.685 | 78.13 ± 12.83 | 77.56 ± 15.72 | 0.719 |
| Citicoline (mean \pm SD) | -8.74 ± 3.70 | -8.71 ± 4.17 | 0.957 | 78.50 ± 12.46 | 78.90 ± 13.16 | 0.687 |
| DHA+Citicoline (mean \pm SD) | -9.52 ± 4.36 | -7.85 ± 4.36 | 0.001 | 75.15 ± 13.76 | 78.90 ± 14.82 | 0.008 |

Comparison between pre- and post-treatment visual field index slopes in each group

| | MD Slopes (dB/Month) | | VFI Slopes (%/Month) | | p Value | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Pretreatment | Post-Treatment | Pretreatment | Post-Treatment | | |
| Global (mean \pm SD) | -0.0613 ± 0.1736 | 0.0867 ± 0.3092 | 0.005 | -0.1107 ± 0.2781 | 0.1625 ± 0.8499 | 0.018 |
| Vitamin C (mean \pm SD) | -0.0502 ± 0.1459 | 0.055 ± 0.2895 | 0.350 | -0.079 ± 0.3665 | 0.1425 ± 0.8992 | 0.485 |
| DHA (mean \pm SD) | -0.0135 ± 0.1116 | 0.0295 ± 0.1939 | 0.733 | -0.0509 ± 0.1998 | 0.0150 ± 0.5971 | 0.532 |
| Citicoline (mean \pm SD) | -0.0624 ± 0.1307 | 0.1029 ± 0.4504 | 0.192 | -0.1364 ± 0.3151 | 0.1733 ± 1.2439 | 0.371 |
| DHA+Citicoline (mean \pm SD) | -0.1041 ± 0.2471 | 0.1383 ± 0.2544 | 0.006 | -0.1557 ± 0.2310 | 0.2780 ± 0.5661 | 0.006 |

MD, mean defect of visual field; dB, decibels; VFI, visual field index; SD, standard deviation; DHA, docosahexaenoic acid.

