



Descubre un nuevo destino para el tratamiento del Glaucoma*^{1,2}

Roclanda[®]:

- Reduce eficazmente la PIO y al mismo tiempo aborda la disfunción de la malla trabecular¹⁻⁵
- Modos de acción complementarios de Latanoprost y Netarsudil, un nuevo inhibidor de la ROCK^{1,6}

NUEVO

 **roclanda[®]**
50µg/ml latanoprost + 200µg/ml netarsudil,
colirio en solución

1. Ficha técnica Roclanda[®] SmPC. 2. Buffault J et al. J Clin Med 2022; 11: 1001. 3. Stalmans I et al. MERCURY-3. Presented at EGS. 2022. 4. Al-Humimat G et al. J Experiment Pharmacol 2021; 13:197-212. 5. Moshifar M et al. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol 2018; 7(3): 101-111. 6. Schehlein E and Robin A. Drugs 2019; 79: 1031-6.

Roclanda[®] (netarsudil 200mcg/ml, latanoprost 50mcg/ml) ,1 frasco de 2,5ml) CN:763210.8
Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico hospitalario.
Financiado por el SNS. PVL: 12,17 €
Santen pharmaceutical Spain, S.L C/ ACANTO, 22. Madrid 28045. email: medinfo@santen.es
Ficha técnica de Roclanda[®] escaneando el código QR
ROC-ES-240002



Santen