



Descubre un nuevo destino para el tratamiento del Glaucoma*^{1,2}

Roclanda®:

- Reduce eficazmente la PIO y al mismo tiempo aborda la disfunción de la malla trabecular¹⁻⁵
- Modos de acción complementarios de Latanoprost y Netarsudil, un nuevo inhibidor de la ROCK^{1,6}

NUEVO



1. Ficha Técnica Roclanda® (latanoprost 0.005%/netarsudil 0.02% colirio en solución). Santen; 2. Buffault J et al. J Clin Med 2022; 11: 1001; 3. Stalmans I, et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2023; 4. Al-Humimat G et al. J Experiment Pharmacol 2021; 13:197-212; 5. Moshifar M et al. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol 2018; 7(3): 101-111; 6. Schehlein E and Robin A. Drugs 2019; 79: 1031-6.

▼ Roclanda® (netarsudil 200mcg/ml, latanoprost 50mcg/ml), 1 frasco colirio en solución de 2,5ml. CN:763210.8.
Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico hospitalario. Financiado por el SNS. PVL: 12,17 €.
▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional.

Santen pharmaceutical Spain, S.L C/ ACANTO, 22. Madrid 28045. email: medinfo@santen.es
ROC-ES-240022



Ficha técnica de Roclanda® escaneando el código QR

Santen